



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

from finall decay'd Towns, where feveral of them were then feated, *in Urbes Celebriores*, *Stigand* then Biſhop of *Selfey* fettled his Epifcopal Chair at that Place.

I ſhall conclude with obſerving, that when this Inſcription was dug up, there were alſo two Walls of Stone diſcovered cloſe by it, three Foot thick each, one running North, the other Eaſt, and joining in an Angle, as the *North-ſtreet* and *St. Martins-lane* now turn, which, in all Probability, were Part of the Foundations of the Temple mentioned on the Marble.

Oſob. 31. 1723.

II. *De Structura Diaphragmatis. Epistola Domini Antonii van Leeuwenhoek, R. S. S. ad Societatem Regiam.*

Delphis, 31 Maii 1723.

IN epistola illa, quam ad Dominum *Jurin* nuper perſcripſi, paucis aperueram opinionem meam de morbo, qui nuperrima hyeme me invaſerat. Statuebam enim malam affectionem Diaphragmatis originem morbo præbuiſſe.

Ut autem de hac Diaphragmatis affectione omnem mihi dubitationem eximerem, Diaphragma ovis anniculæ ad me deferendum curavi; partem illius Diaphragmatis in minuta fruſtula conſectam, ope microſcopii, qua potui diligentia conſideravi; comperique Diaphragma ex parte compositum eſſe ex tenuiſſimis fibrillis; quæ ſine microſcopio conſpectæ latum circiter capillum inter ſe diſtant.

Cum

Cum deinde diversa Diaphragmatis frustra diversis microscopiis applicuiffem, & visu diligenter examinaffem; pro certo ftatui fibrillas illas ex partibus exoriri carnofis, quæ Diaphragmati circa coftas intexuntur. Eafdem fibrillas Diaphragmati vice tendinum infervire judicabam. Tendines ifti, fic mihi dicti, non funt per totum Diaphragma æque fibi vicini: Quin alii aliis, quamvis fibi vicinis, funt aliquânto craffiores.

Cum autem & fibrillas modo dictas, & membranam inter fibrillas exporrectam, rite confideraffem; animadverti Diaphragma, quantum ad maximam fui partem, ex fibrillis iftis, & membrana fibrillis interjecta, compositum effe: Si tamen vaforum fanguineorum & copiofi adipis, quæ Diaphragmati magna copia infident, rationem modo non habeamus.

Membrana vero, inter tendines (ita mihi dictos) interjecta, tot rugulis exiguiſve plicis ſcatebat, ut pene obſtupefcerem: iftas autem rugas five plicas ad hunc uſum naturaliter deſtinatas effe credebam, ut Diaphragma per aëris inſpirationem extenſum rurfus contraherent; eaque ratione opem ſuam conferrent ad aërem, qui Pulmones per inſpirationem impleverat, inde expellendum.

Ut Diaphragmatis contexturam oculis ſpectandum exponerem; exiguam Diaphragmatis ovilli modo dicti portionem delineari, & in icone 2. per ABCDEFGH designari curavi. Ubi BG, CF; & DE, tres funt tendines, ea magnitudine expreſſi, quam microſcopium oculis exhibebat: qui tendines, ut jam ante monui, magnitudine non parum inter ſe differunt. Inter illos vero tendines membranam interjectam videmus; ex quibus tendinibus, & interjecta membrana, Diaphragma maximam partem compositum effe modo dicebam.

Ut autem de vera iconis 2 magnitudine judicare poſſitis, delineatorem, ut veram fruſtuli delineati magnitudinem

dinem digito indicaret, rogavi; qui mox spatium inter Y Z in icone 5. commonstravit.

Adhæc membranam modo dictam permultis iisque exiguiſſimis foraminibus pertuſam eſſe obſervavi: quæ exiguiſſima foramina ab abdomine patebant in pectus, & a pectore viciffim in abdomen. Cum autem fieri non poſſe hætenus judicaverim, ut humor quiſpiam ex pectore delabatur in abdomen, vel ex abdomine ſubvehatur in pectus; nunc fatius mihi videtur, indicium ſuper ea re meum ſuſpendere. Quin ſic mecum diſſero; forte etiam pulmonibus noſtris vaſcula inſunt incomprehenſibilis exilitatis. Quippe ſi cogitemus, quantum humoris ex pulmonibus noſtris per expirationem educatur in aërem, præ exigua humoris copia quam inſpirando ex aëre inferimus in pulmones; facile in ſententiam illam propendebimus.

Sed & hoc non ſemel obſervavi, quod fibrillas illas, quas tendines appello, vaſa quædam perrepant itinere tranſverſo.

In alio ejuſdem Diaphragmatis fruſtulo, quod microſcopio applicatum ſervabam, clare intueri licebat ſtructuram exortumque membranularum; quas inter fibrillas, ſive tendines ſic mihi dictos, interjacere dixi. Membranulas illas permagno plicarum numero, ut etiam præmonui, inſtructas videmus: quæ omnia in icone 3, exhibentur ad L K. Fibrillæ vero, ſive exigui tendines, de quibus modo diſſerebam, in eadem icone deſignantur per L M N O P Q. Verum fibrillæ iſtæ ſunt hic majores, quam uſpiam mihi occurrerint.

Præterea membranam illam, ex qua Diaphragma maximam partem conſtare dixi, quamvis tam tenuem, a ſe divelli, & exiguam avulſæ partis portionem ope microſcopii in icone 4 exprimendam curavi. Quod eo conſilio feci, ut laceros tendines atque membranulas, quan-

tum

tum ars imitari naturam poterat, oculis subjicerem. Ergo hic per R S T V particula indicatur tendinis extensi: ubi & exilissimæ exhibentur fibrillæ, ex quibus prædicta tendinis portio contexta est. In eadem icone per V T & W X portio designatur tendinis quiescentis.

Istud vero neque explicari, neque fatis comprehendi potest, quam incredibilis fibrillarum, vasculorum, & particularum numerus hic inter se conglomeretur; & ad tenuissimæ membranæ, Diaphragmatis inquam, formationem concurrat. Sic autem statuo, quoties validius inspiramus, omnes illas plicas sive sinuosas corrugationes in Diaphragmate evanescere atque complanari: quoties autem expiramus, Diaphragma rursus in plicas rugasve contrahi, quod & superius notavi.

Dum igitur tantam adipis copiam in Diaphragmate gigni, & congregari videmus; prætereaque cogitamus substantiam Diaphragmatis per adipem illum sic utrimque posse crassescere, ut in tumorem extuberet; facile intelligemus Diaphragmatis expansionem atque contractionem ea ratione posse impediri atque pigrescere, atque hinc spirandi difficultatem consequi: ob quam rationem homines obesos præ aliis anhelos esse judicamus. Modico autem adipe Diaphragma perfundi oblique necessarium statuimus: cum enim Diaphragma singulis horis nongenties expandi & nongenties contrahi necesse sit; motus illos per adipem magnopere adjuvari censemus.

Ceterum frequentiori indagatione explorare conatus sum, qua ratione carneæ Diaphragmatis partes, quas costis vicinas esse dixi, transissent in membranam; sive qua ratione membrana Diaphragmatis ex illis esset exorta. Verum licet indagationem illam crebro frequentarem, ipse mihi satisfacere non potui.

Jam & illa dubitatio me subierat, an non tendines, quos ego quidem sic voco, vasculis sint instructi: Et licet microscopio meo vix tantum tribuere auderem; tamen tertio post die indagationem iteravi, & tendines transverse dissecai: quando & illuc indagationem meam dirigebam, ut etiam in membrana Diaphragmatis, quam rugosam esse dixi, sanguinea vasa requirerem. Tandem igitur successit, ut sanguinea vasa secundum longitudinem tendinum protendi, imo octonos denosque invicem adjacere viderem. Inde ad membranam, quæ tendines quasi circumvestit, oculos converti; in eaque tam ingentem observavi numerum exilissimorum vasculorum, ut admiratione defixus hærerem. Complura istorum vasculorum velut areolis inclusa jacebant; quæ tendinum transverse perfectorum vascula esse censebam. Ut autem eorum omnium, quæ modo narravi, testem haberem ocularem; microscopium istud, cui dictas Diaphragmatis particulas applicaveram, Chirurgus meo tradidi; qui dicta mea cum iis quæ videbat, examussim convenire respondit.

Hac tamen observatione non contentus, comparavi Diaphragma bovillum; ex quo circa partes illius carneas, quas costis adjacere dixi, frustum circiter palmarium excidi: comperique Diaphragma bovillum circiter quadruplo crassius esse ovillo; & hanc crassitudinem maxima ex parte illius adipi acceptam esse referendam.

Exinde ex illa Diaphragmatis portione lamellam quam potui tenuissimam abscidi; quoties enim paulo crassiorem exscindebam, persecabam adipem, qui versus medium Diaphragmatis protenditur; puta, ubi Diaphragma fatis est crassum, neque adipis expers. Diaphragma vero utrinque, id est, superius atque inferius, quatuor distinctis constat membranis, earumque tendinibus;

tendinibus; qui tendines membranis veluti inclusi delitefcunt.

Iſtorum autem tendinum ingens multitudo non poterat mihi non admirationem parere: neque ſatis credibile videbatur in corpore, cujus ſtructura functioneſque tam parum ſunt cognitæ, in Diaphragmate inquam, tales tamque multiplices partes includi.

Ut Diaphragmatis bovilli ſtructuram oculis exponerem, partem illius in icone 6 ad A B C D exprimendam curavi, ubi primo quatuor exhibentur partes diſtinctorum tendinum, qui magno numero invicem adjacent, & ſupra in Diaphragmate ovillo etiam ſunt exhibiti. Verum per integrum bœvis Diaphragma iſtiuſmodi diffunduntur exiguiſſimi tendines, quos ego quidem ſic appello. Et hos quidem tendines, una cum membranis, neceſſe eſt in rite conſtituto corpore ſine ulla intermiſſione alternatim extendi atque contrahi; quæ omnia in icone 6 ſatis accurate delineator expreſſit.

Tenuiſſimas illas fibrillas, uti & membranarum rugulas plicafve, per crebram indagationem etiam ex voto meo deprehendi in Diaphragmate ovillo; nec ipſe tantum ſæpius cum voluptate conſideravi, ſed & aliis conſiderandas exhibui. Ceterum tendines illos, ita mihi dictos, & tenuiſſimas particulas tranſverſe perſecui; inquirere volens num forte ſint perviæ, & cavitatibus præditæ. Quando incredibilis exilitatis vaſcula tanto numero in oculos meos incurrerunt; ut, qui ipſe non viderit, vix mihi ſit habiturus fidem. Tum & ingentem percepi numerum exiguiſſimorum vaſculorum, quæ tranſverſo Diaphragma itinere permeabant; & quantum ego quidem ſentiebam, ad hoc officium a natura deſtinantur, ut adipem per omnes Diaphragmatis partes circumferant, & ipſi Diaphragmati continuum alimentum ſubminiſtrent.

Superius modo dixi adipem in Diaphragmate inclusum latere; & utrumque super adipem quatuor exporrigi membranas, inter se omnino distinctas. Addo membranas istas tam arcte sibi conjunctas esse, ut simplex esse membrana videatur.

Jam vero alteri microscopio, quod paulo minus quam microscopia modo dicta magnitudinem objectorum augebat, frustum Diaphragmatis mediocris crassitudinis admoveram. Quod eo spectabat, ut demonstrarem, qua ratione membranæ partes Diaphragmatis adiposas, sive ipsum Diaphragmatis adipem, utrumque circumdant; adeo ut adeps in membranis illis includi videatur. Id autem in icone 7 indicatur per EFGHIKLM, ubi per EFGH, item per IKLM, duæ istæ quadruplices designantur membranæ; in GH vero, & IK, adeps sæpe jam dictus includitur.

Cum deinde tenuissimam Diaphragmatis portionem, quæ præ manibus erat, in orbes conscindere conarer, Diaphragma in duas partes sive lamellas secessit; unde suspicatus sum Diaphragma sic a natura comparatum esse, ut adeps eo facilius per Diaphragmatis substantiam distribuatur.

In icone 7, ubi membranæ transverse sectæ exhibentur, quædam exiguæ apparent corrugationes, quas in iis plerumque percepi. Postea comperi membranulas, in quibus adeps coeundo producitur, exilissimis vasculis annexas esse; quæ tamen vascula per contiguarum partium exsiccationem in Diaphragmate jam dicto erant disrupta. Hanc ego membranularum & vasculorum connexionem ex eo capite necessariam existimo; ne Diaphragma, quoties extenditur, omnino complanetur, sed in cavitatem pene globosam sese expandat.

Forte complures Diaphragma sentient esse membranam apprimè crassam; cum tamen sit membrana perexilis.

exilis. Ut igitur hunc illis errorem eximam; frustulum Diaphragmatis bovilli, sicut se nudis oculis offert, delineandum curavi: Istud tamen verum est, Diaphragma pro tenuitate sua esse oppido robustum, quod multitudini exilissimorum tendinum, de quibus sæpius egi, tribuendum esse statuo.

Igitur per *N O P Q*, in icone 8, frustulum designatur Diaphragmatis bovilli: ubi per fibrillam *N O* unum latus, sive dimidia crassitudo, Diaphragmatis bovilli indicatur; per *P Q* altera crassitudinis illius medietas exprimitur. Reliquum Diaphragmatis, nempe quidquid inter *O P* & *N Q* interclusum est, adipe sive partibus adiposis est oblitum: nisi quod inter *N Q* nonnihil carnis interjaceat, pertinens ad carnem costis adjacentem.

Igitur quo morbum antedictum, qui nupera hyeme me corripuit, & quem ego Diaphragmati maxima ex parte imputabam, sæpius in memoriam revoco; eo etiam sæpius Medicos errare cogito, dum palpitationem, quam in pectoris regione quandoque percipimus, cordis palpitationem appellant. Certe ego tales palpitationes ex mala Diaphragmatis affectione oriri censeo; sive affectionem illam producat alimenti defectus, sive vaforum quorundam efficiat obstipatio, quæ Diaphragma magno numero pervagantur. Talis enim obstipatio in ante-dictis tendinibus facile convulsivos motus excitare potest; & hanc morbi mei ipsissimam fuisse causam existimo.